

Richtlijn Delier in de palliatieve fase - module Dosering en toedieningsvormen van medicamenteuze behandeling bij delier

Toedieningsvormen

Tabel 8. Overzicht van behandelopties voor orale toediening

Middel	Oraal	
Haloperidol	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet: (0,25*), 1; 5 en 10 mg • Druppelvloeistof 2 mg/ml (flesje van 30 ml). Eén druppel komt overeen met 0,1 mg** 	<p>*Grootbereiders als ACE en Fagron maken ook wel 0,25 mg. Maar niet altijd bij apotheken op voorraad of snel te bestellen.</p> <p>** kan eventueel via de wangzak (buccaal) worden toegediend. Bij buccale toediening niet doorslikken, niet verdunnen ondanks vieze smaak. Hierdoor snelle absorptie via de mucosa in de circulatie en daarmee gelijkwaardig aan parenteraal</p>
Clozapine	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet: 25; 50; 100; 200 mg • Tablet orodispergeerbaar: 12,5; 25; 50; 100; 200 • Drank 25 mg/ml 	
Olanzapine	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet 2,5; 5; 10; 15 en 20 mg. • Tablet orodispergeerbaar: 5; 10; 15 en 20 mg. 	<p>Gewone tab mag fijngemaakt worden Poeder voor inj is geschikt voor orale toediening. Evt kan een suspensie besteld worden maar dit kan langer duren</p>
Quetiapine	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet 25; 100; 150; 200 en 300 mg • Tablet met gereguleerde afgifte: 50; 100; 150; 200; 300 (en 400 mg) (niet oplossen) 	<p>Gewone tablet kan in warm water (in een spuit uiteen laten vallen*) opgelost worden.</p> <p>*= methode B, www.oralia.nl of Handboek Enteralia</p>
Risperidon	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet 0,5; 1; 2; 3, 4 (en 6) mg • Drank 1 mg/ml 	
Rivastigmine	<ul style="list-style-type: none"> • Capsule 1,5; 3,0; 4,5 en 6,0 mg (NB voorkeur voor pleister) 	Mag opengemaakt worden om inhoud te mengen met vloeistof of voedsel
Mogelijke comedicatie naast de antipsychotica		
Lorazepam	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet 0,5; 1 en 2,5 mg 	Kan ook s.l.
Midazolam	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet: oraal midazolam is onvoldoende effectief 	Kan wel buccaal (injectievloeistof) Oromucosaal 5 mg/ml (wegwerpspuit, bijbetalen)
Oxazepam	<ul style="list-style-type: none"> • Tablet 10; 50 mg 	Tablet mag fijngemaakt worden

Referenties

1. Elsayem A, Bush SH, Munsell MF, Curry E 3rd, Calderon BB, Paraskevopoulos T, Fadul N, Bruera E. Subcutaneous olanzapine for hyperactive or mixed delirium in patients with advanced cancer: a preliminary study. *J Pain Symptom Manage.* 2010 Nov; 40(5): 774-82.
2. NHG 2020. [Behandelrichtlijn geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.](#)
3. NHG 2014. [Standaard delier versie 2.1](#)
4. Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch Kompas. Beschikbaar via <https://farmacotherapeutischkompas.nl>.