

Wells criteria voor een DVT	Punten
Maligniteit (tijdens of <6 maanden na behandeling)	1.0
Immobilisatie (parese/paralyse/gipsspalk)	1.0
Bedrust >3 dagen of operatie <4 weken geleden	1.0
Gelocaliseerde pijn in het verloop van de diepe vene	1.0
Zwelling van het gehele been	1.0
Verschil in kuitomvang >3 cm	1.0
Pitting oedeem van het symptomatische been	1.0
Uitgezette oppervlakkige vene	1.0
Andere diagnose waarschijnlijk	-2.0

	Totaal score
Kans op DVT	
Laag	≤0
Intermediair	1.0-2.0
Hoog	≥3.0
Diagnose DVT	
Onwaarschijnlijk	<2
Waarschijnlijk	≥2

Wells criteria voor een longembolie	Punten
Klinische verschijnselen van een DVT	3.0
Geen andere verklaring voor klachten dan longembolie	3.0
Hartfrequentie >100/minuut	1.5
Immobilisatie of chirurgie in de afgelopen 4 weken	1.5
Voorgeschiedenis met DVT of longembolie	1.5
Hemoptoë	1.0
Maligniteit	1.0

	Totaal score
Kans op longembolie	
Laag	<2.0
Intermediair	2.0-6.0
Hoog	>6.0
Diagnose longembolie	
Onwaarschijnlijk	<4.0
Waarschijnlijk	>4.0