

Opioïd naïef, geen speed

Middel	Dosering
Morfine retard tablet 10,30, 60 mg	2dd 10 mg
Morfine drank 5mg/ml	6dd 2,5-5mg of zn
Morfine tablet instant release 10mg, 20mg	Switch naar Morfine retard als effectieve dagdosis is gevonden (2dd ½ van de effectieve dagdosis)

Opioïd naïef, speed of oraal niet mogelijk

Middel	Dosering
Morfine Ampullen 10mg/ml	- Extramuraal: 6dd 2,5-5mg morfine s.c. of i.v. - Intramuraal: 15mg/24 uur continu s.c. of i.v.

Morfine gebruikend, geen speed

Verhoog de dagdosis met 25-50% Voorbeeld: Morfine retard 2dd10mg naar 3dd 10mg

Morfine gebruikend, speed of oraal niet mogelijk

Stappen:	Voorbeeld:
1. Verhoog de dagdosis met 25-50%	Dagdosis van 40mg naar 60mg Morfine retard
2. Bepaal de equianalgetische dosis morfine i.v.	60mg oraal = 20mg morfine/24 uur s.c. of i.v.
3.	
Extramuraal: 6dd 1/6 vd dag dosis i.v./s.c.	20mg:6= 6dd 3,5mg morfine s.c./i.v.
Intramuraal: continue infusie van dagdosis in 24 uur	20mg morfine/24 uur = 1mg uur i.v./s.c.

Ander Opioïd, geen speed

Bepaal de equianalgetische dosis morfine en geef deze per os.

Alternatief: verhoog de dagdosis van het huidige opioïd met 25-50%

Ander Oioïd, speed of oraal niet mogelijk

Stappen:	Voorbeeld:
1. Bepaal de equianalgetische dosis morfine i.v./s.c.	Fentanyl pleister 50ug/uur = 40mg/24 uur morfine s.c./i.c
2.	
Extramuraal: 6dd 1/6 vd dag dosis i.v./s.c.	40mg:6= 6dd 7mg morfine s.c./i.v.
Intramuraal: continue infusie van dagdosis in 24 uur	40mg morfine/24 uur = 1,5mg/uur

Beoordeling effect

Orale medicatie	Na 24 uur. Hoog bij onvoldoende effect medicatie op in stappen van 25-50%
Parenterale medicatie	Na 4 uur. Hoog bij onvoldoende effect medicatie op in stappen van 25-50%

Rescue medicatie

In alle gevallen: z.n. 1/6 van de dagdosis

NB: Voor equianagetische dosering zie tabel 2.